



hormonais

não hormonais

| Produto       | Diâmetro do implante | Diâmetro do Trocater | Liberação (mg/dia) | Duração *   |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| Estradiol     |                      |                      |                    |             |
| 10 mg         | 3,40 mm              | 3,5 mm               | 0,08               | 4 a 6 meses |
| 12,5 mg       | 3,40 mm              |                      | 0,10               | 4 a 6 meses |
| 15 mg         | 3,40 mm              |                      | 0,12               | 4 a 6 meses |
| 20 mg         | 3,40 mm              |                      | 0,16               | 4 a 6 meses |
| 25 mg         | 3,40 mm              |                      | 0,20               | 4 a 6 meses |
| 35 mg         | 3,40 mm              |                      | 0,30               | 4 a 6 meses |
| Estriol       |                      |                      |                    |             |
| 75 mg         | 3,00 mm              | 3,5 mm               | 0,45               | 4 a 6 meses |
| Gestrinona*   |                      |                      |                    |             |
| 25 mg         | 3,15 mm              | 3,5 mm               | 0,25               | 3 a 4 meses |
| 35 mg         | 2,90 mm              |                      | 0,25               | 4 a 6 meses |
| 40 mg         | 3,15 mm              |                      | 0,30               | 4 a 6 meses |
| 50 mg         | 3,15 mm              |                      | 0,40               | 4 a 6 meses |
| 85 mg         | 3,45 mm              |                      | 0,65               | 4 a 6 meses |
| 100 mg        | 3,45 mm              |                      | 0,70               | 4 a 6 meses |
| Oxandrolona*  |                      |                      |                    |             |
| 25 mg         | 3,40 mm              | 3,5 mm               | 0,20               | 4 a 5 meses |
| 50 mg         | 3,10 mm              | 3,5 mm               | 0,40               | 4 a 6 meses |
| 100 mg        | 3,40 mm              | 3,5 mm               | 0,60               | 4 a 6 meses |
| Progesterona  |                      |                      |                    |             |
| 50 mg         | 2,85 mm              | 3,5 mm               | 0,40               | 4 a 6 meses |
| Testosterona* |                      |                      |                    |             |
| 25 mg         | 3,40 mm              | 3,5 mm               | 0,25               | 3 a 5 meses |
| 50 mg         | 3,40 mm              | 3,5 mm               | 0,40               | 3 a 5 meses |
| 75 mg         | 2,95 mm              | 3,5 mm               | 0,60               | 4 a 6 meses |
| 100 mg        | 3,45 mm              | 3,5 mm               | 0,70               | 4 a 6 meses |
| Ocitocina*    |                      |                      |                    |             |
| 500 UI        | 3,30 mm              | 3,5 mm               | 2,0 a 3,5 UI/dia   | 4 a 6 meses |
| Drospirenona  |                      |                      |                    |             |
| 50 mg         | 2,85 mm              | 3,5 mm               | 0,40               | 4 a 6 meses |
| Tadalafil     |                      |                      |                    |             |
| 25 mg         | 3,15 mm              | 3,5 mm               | 0,20               | 3 a 5 meses |
| 50 mg         | 3,10 mm              | 3,5 mm               | 0,40               | 4 a 6 meses |
| NAD           |                      |                      |                    |             |
| 100 mg        | 3,45 mm              | 3,5 mm               | 0,60               | 3 a 5 meses |
| Metformina    |                      |                      |                    |             |
| 100 mg        | 3,11 mm              | 3,5 mm               | 0,70               | 4 a 6 meses |
| Anastrozol    |                      |                      |                    |             |
| 5 mg          | 3,20 mm              | 3,5 mm               | 0,04               | 4 a 5 meses |
| 10 mg         | 3,40 mm              | 3,5 mm               | 0,08               | 4 a 5 meses |

Os implantes proporcionam níveis consistentes e saudáveis do ativo, sendo que as taxas de liberação descritas acima referem-se à liberação média nominal ao longo do tratamento, e dependem da dose e de fatores fisiológicos individuais.

\* Aplicam-se os requisitos da Portaria Nº 344 de 12 de Maio de 1998, Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial.



clique nos contatos para falar diretamente conosco:

[www.biomedspharma.com.br](http://www.biomedspharma.com.br)

@biomedsbrazil